toporo animal health

+2

Rumen

Ter ondersteuning van de pensflora

To support the rumen flora

Zur Unterstützung der Pansenflora

Pour soutenir la flore du rumen

Wspomaganie flory żwacza

För att stödja vommens flora

12 x 75 g

NL

Aanvullend diervoeder voor rundvee in de vorm van een bolus voor orale toediening, ter ondersteuning van de pensflora.

Samenstelling
Sorbitol, gehard geraffineerd plantaardig vet van koolzaad, gist (geïnactiveerd), magnesiumoxide, calciumzouten van stearinezuren.

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit	11,8%
Ruw vet	10,1%
Ruwe as	14,1%
Ruwe celstof	0,5%
Natrium	0,1%
Calcium	3,5%
Magnesium	2,3%

Toevoegingsmiddelen
Conserveermiddelen
1a282 calciumpropionaat 150.000 mg/kg

Nutritionele toevoegingsmiddelen
Vitaminen
3a314 nicotinezuur 400.000 mg/kg

Sporenelementen
3b302 kobalt (kobalt(II)carbonaat)
100 mg/kg

Dosering
Minimale dosering
- 1 bolus onmiddellijk na het afkalven.
- 1 bolus in geval van verminderde activiteit van de pensflora (verlies van eetlust).

Extra dosering
- Eventueel na 24 uur weer 1 bolus toedienen.

Gebruiksaanwijzing
- Toedienen met een geschikte bolusschieter (folie verwijderen).
- Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt.
- Er moeten beschermende maatregelen worden genomen om blootstelling aan kobalt door inademing of via de huid te vermijden.

Bewaaradvies
Droog en buiten bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht, vorst en temperaturen boven 30 °C.

Ten minste houdbaar tot
Zie verpakking.

Batchnr.
Zie verpakking.

EN

Complementary feed for cattle in the form of a bolus for oral administration, to support the rumen flora.

Composition
Sorbitol, hydrogenated refined vegetable fat from rapeseed, inactivated yeast, magnesium oxide, calcium salts of stearic acids.

Analytical constituents

Crude protein	11.8%
Crude fat	10.1%
Crude ash	14.1%
Crude fibre	0.5%
Sodium	0.1%
Calcium	3.5%
Magnesium	2.3%

Additives
Preservatives
1a282 calcium propionate 150,000 mg/kg

Nutritional additives
Vitamins
3a314 nicotinic acid 400,000 mg/kg

Trace elements
3b302 cobalt (cobalt(II) carbonate)
100 mg/kg

Dosage
Minimum dosage
- 1 bolus immediately after calving.
- 1 bolus in case of reduced activity of the rumen flora (loss of appetite).

Extra dosage
- If necessary, administer 1 bolus again after 24 hours.

Instructions for use
- Administer using a suitable bolus applicator (remove the foil).
- The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated where one or more of them is used at or near the maximum permitted content.
- Protective measures to avoid exposure with Cobalt by inhalation or by dermal route should be taken.

Storage instructions
Store in a dry place and out of reach of children. Protect from direct sunlight, frost and temperatures above 30 °C.

Best before
See packaging.

Batch No.
See packaging.

DE

Ergänzungsfuttermittel für Rinder in Form eines Bolus zur oralen Verabreichung, zur Unterstützung der Pansenflora.

Zusammensetzung
Sorbit, gehärtetes raffiniertes Pflanzenfett aus Raps, inaktivierte Hefe, Magnesiumoxid, Calciumsalze von Stearinsäuren.

Analytische Bestandteile

Rohprotein	11,8%
Rohfett	10,1%
Rohasche	14,1%
Rohfaser	0,5%
Natrium	0,1%
Calcium	3,5%
Magnesium	2,3%

Zusatzstoffe
Konservierungsstoffe
1a282 Calciumpropionat 150.000 mg/kg

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Vitamine
3a314 Nicotinsäure 400.000 mg/kg

Spurenelemente
3b302 Cobalt (Cobalt(II)-carbonat)
100 mg/kg

Dosierung
Mindestdosierung
- 1 Bolus unmittelbar nach dem Abkalben.
- 1 Bolus bei verminderter Aktivität der Pansenflora (Appetitverlust).

Zusätzliche Dosierung
- Bei Bedarf nach 24 Stunden einen weiteren Bolus verabreichen.

Gebrauchsanweisung
- Mit einem geeigneten Bolusapplikator verabreichen (Folie entfernen).
- Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.
- Es sollten Schutzmaßnahmen zur Verhinderung einer Exposition gegenüber Cobalt durch Inhalation oder über die Haut ergriffen werden.

Lagerungshinweise
Trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und Temperaturen über 30 °C schützen.

Mindestens haltbar bis
Siehe Verpackung.

Chargennr.
Siehe Verpackung.

FR

Aliment complémentaire pour bovins sous forme de bolus pour administration orale, destiné à soutenir la flore du rumen.

Composition
Sorbitol, graisse végétale hydrogénée et raffinée de colza, levure inactivée, oxyde de magnésium, sels de calcium d'acides stéariques.

Constituants analytiques

Protéines brutes	11,8%
Matières grasses brutes	10,1%
Cendres brutes	14,1%
Cellulose brute	0,5%
Sodium	0,1%
Calcium	3,5%
Magnésium	2,3%

Additifs
Conservateurs
1a282 propionate de calcium 150 000 mg/kg
Additifs nutritionnels
Vitamines
3a314 acide nicotinique 400 000 mg/kg
Oligo-éléments
3b302 cobalt (carbonate de cobalt(II))
100 mg/kg

Dosage
Dosage minimal
- 1 bolus immédiatement après le vêlage.
- 1 bolus en cas de baisse d'activité de la flore ruminale (perte d'appétit).

Dosage supplémentaire
- Si nécessaire, administrer à nouveau 1 bolus après 24 heures.

Mode d'emploi
- Administrer à l'aide d'un applicateur de bolus adapté (retirer le film).
- L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.
- Des mesures de protection devraient être prises pour éviter l'exposition au cobalt par inhalation ou par voie dermique.

Conditions de stockage
Conserver au sec et hors de portée des enfants. Protéger de la lumière directe du soleil, du gel et des températures supérieures à 30 °C.

À utiliser de préférence avant
Voir emballage.

N° de lot
Voir emballage.

PL

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla bydła w postaci bolusa do podawania doustnego, wspomagająca florę żwacza.

Skład
Sorbitol, uwodorniony rafinowany tłuszcz roślinny z rzepaku, inaktywowane drożdże, tlenek magnezu, sole wapniowe kwasów stearynowych.

Składniki analityczne

Białko surowe	11,8%
Tłuszcz surowy	10,1%
Popiół surowy	14,1%
Włókno surowe	0,5%
Sód	0,1%
Wapń	3,5%
Magnez	2,3%

Dodatki
Konserwanty
1a282 propionian wapnia 150 000 mg/kg

Dodatki dietetyczne
Witaminy
3a314 kwas nikotynowy 400 000 mg/kg

Pierwiastki śladowe
3b302 kobalt (węglan kobaltu(II)) 100 mg/kg

Dawkowanie
Dawka minimalna
- 1 bolus bezpośrednio po wycieleniu.
- 1 bolus w przypadku zmniejszonej aktywności flory żwacza (utrata apetytu).

Dodatkowa dawka
- Ewentualnie podać ponownie 1 bolus po 24 godzinach.

Instrukcja użycia
- Podawać za pomocą odpowiedniego aplikatora do bolusów (usunąć folię).
- Jednoczesne stosowanie różnych kwasów organicznych lub ich soli jest przeciwwskazane, jeżeli co najmniej jeden lub jedna z nich są stosowane na poziomie równym maksymalnej dozwolonej zawartości lub do tego poziomu zbliżonym.
- Należy zastosować środki ochronne zapobiegające pobraniu kobaltu poprzez wdychanie lub przez skórę.

Instrukcja przechowywania
Przechowywać w suchym miejscu i poza zasięgiem dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i temperaturami powyżej 30 °C.

Najlepiej wykorzystać przed
Patrz opakowanie.

Numer partii
Patrz opakowanie.

SE

Kompletteringsfoder för nötkreatur i form av en bolus för oral administrering, för att stödja vämmens mikroflora.

Sammansättning
Sorbitol, hydrerat raffinerat vegetabiliskt fett från raps, inaktiverad jäst, magnesiumoxid, kalciumsalter av stearinsyror.

Analytiska beståndsdelar

Råprotein	11,8%
Råfett	10,1%
Råaska	14,1%
Växttråd	0,5%
Natrium	0,1%
Kalcium	3,5%
Magnesium	2,3%

Tillsatser
Konserveringsmedel
1a282 kalciumpropionat 150 000 mg/kg

Näringstillsatser
Vitaminer
3a314 nikotinsyra 400 000 mg/kg

Spårämnen
3b302 kobolt (kobolt(II)karbonat) 100 mg/kg

Dosering
Minsta dosering
- 1 bolus direkt efter kalvning.
- 1 bolus vid nedsatt aktivitet av vomfloran (aptitlöshet).

Extra dosering
- Om nödvändigt, administrera 1 bolus igen efter 24 timmar.

Bruksanvisning
- Administrera med en lämplig bolusapplikator (avlägsna folien).
- Samtidig användning av olika organiska syror eller deras salter är kontraindicerad om en eller flera av dem används vid eller nära den högsta tillåtna halten.
- Skyddsåtgärder bör vidtas för att undvika exponering för kobolt genom inandning eller via huden.

Förvaringsanvisningar
Förvaras torrt och utom räckhåll för barn. Skyddas mot direkt solljus, frost och temperaturer över 30 °C.

Bäst före
Se förpackningen.

Partinr.
Se förpackningen.

12 x 75 g

Rumen

Topro: registered trademark of Farmula farming forward

Farmula GmbH
Eper Straße 3
D-48599 Gronau
info@farmula.de www.farmula.de

Erkenningsnr. Producent
Registration No. manufacturer
Zulassungs-Nr. Hersteller
No agrément du producteur
αFR24037002

GMP+ FRA geborgd MI5.4
GMP+ FRA assured MI5.4
Garanti GMP+ FRA MI5.4
GMP+ FRA gesichert MI5.4

Gwarancja GMP+ FRA MI5.4
GMP+ FRA garanterat MI5.4
GMO controlled
PDV103322

8 713296 021506

topro animal health

+2



102150-NL/EN/DE/FR/PL/SE-4-10082026