



5 L

Calcium-P liquid

- NL** Ter vermindering van het risico op melkziekte en subklinische hypocalciëmie.
- EN** For reduction of the risk of milk fever and subclinical hypocalcaemia.
- DE** Zur Verringerung des Risikos von Milchfieber und subklinischer Hypokalzämie.
- SE** För att minska risken för kalciumbrist (mjölkfeber) och subklinisk hypokalcemi.
- PL** W celu zmniejszenia ryzyka gorączki mlecznej i subklinicznej hipokalcemii.

NL

Aanvullend dietvoeder voor melkkoeien, geiten en schapen. Ter vermindering van het risico op melkziekte en subklinische hypocalciëmie.

Samenstelling

Calciumchloride, dicalciumfosfaat, magnesiumchloride, calcium-gluconaat, natriumcitraat

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit 0,52%, ruw vet 0,01%, ruwe celstof 1,16%, ruwe as 30,83%, vocht 38,48%, calcium 10%, fosfor 4%, natrium 0,12%, magnesium 0,6%

Toevoegingsmiddelen per liter

Vitamine 3a671 Vitamine D3 25.000 IE Aminozuren, de zouten en de analogen daarvan 3c320 L-lysine base, vloeibaar 5.000 mg

Dosering

- Melkkoeien: 500 ml per dier
- Melkgeiten en schapen: 50 ml per dier

Dien 1 dosis Calcium-P liquid toe binnen 24 uur vóór het afkalven of direct na het afkalven. Indien nodig, dien een tweede dosis toe 12 tot 24 uur na het afkalven.

Gebruiksaanwijzing

- Goed schudden voor gebruik.
- Mogelijke kleurveranderingen beïnvloeden de werking van het product niet. Na opening snel gebruiken.
- Raadpleeg voor gebruik een dierenarts of voedings-deskundige.

Bewaaraadvies

Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

DE

Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe, Ziegen und Schafe. Zur Verringerung des Risikos von Milchfieber und subklinischer Hypokalzämie.

Zusammensetzung

Calciumchlorid, Dicalcium-phosphat,

Magnesiumchlorid, Calciumglukonat, Natriumcitraat.

Analytische Bestandteile

Rohprotein 0,52%, Rohfett 0,01%, Rohfaser 1,16%, Rohasche 30,83%, Feuchtigkeit 38,48%, Calcium 10%, Phosphor 4%, natrium 0,12%, Magnesium 0,6%

Zusatzstoffe pro Liter

Vitamine 3a671 Vitamin D3 25.000 IE Aminosäuren, deren Salze und Analoga 3c320 L-Lysin Base, flüssig 5.000 mg

Dosierung

- Milchkühe: 500 ml pro Tier
- Milchziegen und Schafe: 50 ml pro Tier

Verabreichen Sie eine Dosis Calcium-P liquid innerhalb von 24 Stunden vor dem Kalben oder unmittelbar danach. Bei Bedarf eine zweite Dosis 12 bis 24 Stunden nach dem Kalben verabreichen.

Gebrauchsanweisung

- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Mögliche Farbveränderungen beeinträchtigen die Wirksamkeit des Produkts nicht. Nach dem Öffnen zügig verwenden.
- Vor der Verwendung Tierarzt oder Futterberater konsultieren.

Lagerungshinweise

Kühl, trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen.

SE

Kompletteringsfoder för mjölkkor, getter och får. För att minska risken för mjölkfeber och subklinisk hypokalcemi.

Sammansättning

Kalciumklorid, Dikalciumfosfat, Magnesiumklorid, Kalcium-glukonat, Natriumcitraat.

Analytiska beståndsdelar

Råprotein 0,52%, råfett 0,01%, råfiber 1,16%, råaska 30,83%, vattenhalt 38,48%, kalcium 10%, fosfor 4%, natrium 0,12%, magnesium 0,6%

Tillsatser per liter

Vitaminer 3a671 Vitamin D3 25.000 IE Aminosyror, deras salter och analoger 3c320 L-lysinbas, flytande 5 000 mg

Dosering

- Mjölkkor: 500 ml per djur
- Getter och får: 50 ml per djur

Ge en dos Calcium-P liquid inom 24 timmar före kalvning eller direkt efter. Vid behov, ge en andra dos 12 till 24 timmar efter kalvning.

Bruksanvisning

- Skaka väl före användning.
- Färgförändringar påverkar inte produktens funktion. Används snarast efter öppning.
- Rådgör med veterinär eller foderrådgivare före användning.

Lagringsanvisningar

Förvara produkten svalt, torrt och utom räckhåll för barn. Skydda mot frost.

PL

Uzupełniająca pasza dietetyczna dla krów mlecznych, kóz i owiec. W celu zmniejszenia ryzyka gorączki mlecznej i subklinicznej hipokalcemii.

Skład

Chlorek wapnia, diwodorofosforan wapnia, chlorek magnezu, glukonian wapnia, cytrynian sodu.

Składniki analityczne

Białko surowe 0,52%, tłuszcz surowy 0,01%, włókno surowe 1,16%, popiół surowy 30,83%, wilgotność 38,48%, wapń 10%, fosfor 4%, sód 0,12%, magnez 0,6%

Dodatki na liter

Witamina 3a671 Witamina D3 25.000 JM Aminokwasy, ich sole i analogi 3c320 L-izyna w postaci płynnej 5.000 mg

Dawkowanie

- Krowy mleczne: 500 ml na sztukę (1 butelka)
- Kozy mleczne i owce: 50 ml na sztukę

Podawać 1 dawkę Calcium-P liquid w ciągu 24 godzin przed wycieleniem lub bezpośrednio po wycieleniu. W razie potrzeby podać drugą dawkę 12–24 godziny po wycieleniu.

Sposób użycia

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
- Możliwe zmiany koloru nie wpływają na skuteczność produktu.
- Po otwarciu zużyć możliwie szybko.
- Przed użyciem skonsultować się z lekarzem weterynarii lub specjalistą ds. żywienia zwierząt.

Warunki przechowywania
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Chronić przed mrozem.

Manufacturing date

Best Before

Batchnr.

Product-No.

Registration No. manufacturer

α DE NI 400036

PDV103322

GMP+ FSA assured

GMO controlled

Topro:

registered trademark of

Farmula
farming forward

Farmula B.V.

Sluiskolk 3-5

7681 KC Vroomshoop NL

info@topro.nl

www.topro.nl



8 713296 021667