



animal health
topro

Ter vermindering van het risico op melkziekte en subklinische hypocalcaëmie
To reduce the risk of milk fever and subclinical hypocalcaemia
Zur Verringerung des Risikos von Milchfieber und subklinischer Hypokalcaëmie
Réduction du risque de fièvre vitulaire et d'hypocalcémie subclinique
Aby zmniejszyć ryzyko gorączki mlecznej i subklinicznej hipokalcaemii
För att minska risken för mjölkfeber och subklinisk hypokalcaemi
Met fofor en vitamine D3 | with phosphorus and vitamin D3

calcium

12 x 65 g



NL
Mineraal diëetvoeder voor melkkoeien in vorm van een bolus voor orale toediening, ter vermindering van het risico op melkziekte en subklinische hypocalcaëmie.

Toepassing
De Topro Calcium bolus is een snel oplosbaar calciumsupplement dat toegediend wordt aan melkkoeien vanaf de eerste tekenen van kalven tot twee dagen na het kalven.

Samenstelling
Dicalciumfosfaat, magnesiumoxide, calciumzouten van stearinezuur.

Analytische bestanddelen	
Calcium	27%
Magnesium	1,3%
Natrium	<0,1%
Fosfor	8,1%

Toevoegingsmiddelen
Nutritionele toevoegingsmiddelen
36671 Vitamine D3 233.000 IE/kg

Technologische toevoegingsmiddelen
12338 Calciumformaat 400.000 mg/kg

Dosering
Minimale dosering
• 2 bolussen 12 tot 24 uur voor het kalven of onmiddellijk na het kalven.

Extra dosering
• 1 of 2 bolussen 10 tot 12 uur na het kalven.
• 1 of 2 bolussen 24 uur na het kalven.
• 1 of 2 bolussen bij tekenen van een calciumtekort.

Na een calciuminfusie
• 2 bolussen 2-12 uur na infusie.
• 1 of 2 bolussen bij tekenen van een calciumtekort.

Gebruiksaanwijzing
• Toedienen met een geschikte bolusschiet (fremove foil). Niet toedienen aan een leidend dier.
• Aanbevolen wordt om voor het gebruik het advies van een diervoederdeskundige in te winnen.
• Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt.

Bewaaraadvies
Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

Elke bolus bevat 26,6 g calcium.

Tenninste houdbaar tot
Zie verpakking.

Batchnr.
Zie verpakking.

EN
Dietetic mineral feed for dairy cows in the form of a bolus for oral administration, to reduce the risk of milk fever and subclinical hypocalcaemia.

Application
The Topro Calcium bolus is a rapidly dissolving calcium supplement administered to dairy cows from the first signs of calving to two days after calving.

Composition
Dicalcium phosphate, magnesium oxide, calcium salts of stearic acids.

Analytical constituents and amounts	
Calcium	27%
Magnesium	1,3%
Sodium	<0,1%
Phosphorus	8,1%

Additives
Nutritional additives
36671 Vitamin D3 233,000 IU/kg

Technological additives
12338 Calcium formate 400,000 mg/kg

Dosage
Minimum dosage
• 2 boluses 12 to 24 hours before calving or immediately after calving.

Additional dosage
• 1 or 2 boluses 10 to 12 hours after calving.
• 1 or 2 boluses 24 hours after calving.
• 1 or 2 boluses in case of signs of a calcium deficiency.

After a calcium infusion
• 2 boluses 2-12 hours after infusion.
• 1 or 2 boluses in case of signs of a calcium deficiency.

Instructions for use
• Administer with a suitable bolus applicator (remove foil). Do not administer to a lying animal.
• Before use, we recommend taking advice from a veterinarian or nutritionist.
• The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated when one or more of them are used at or near the maximum permitted level.

Storage instructions
Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost.

Each bolus contains 26.6 g calcium.

Best before
See packaging.

Batch No.
See packaging.

DE
Diätetisches Mineralfuttermittel für Milchkühe in Form eines Bolus zur oralen Verabreichung, zur Verringerung des Risikos von Milchfieber und subklinischer Hypokalcaëmie.

Anwendung
Die Topro Calcium Bolus ist ein schnell löslicher Calciumsupplement, der an Milchkühe zur Verbesserung der Calciumversorgung ab den ersten Anzeichen vor dem Kalben bis zu zwei Tage nach dem Kalben verfüttert wird.

Zusammensetzung
Dicalciumphosphat, Magnesiumoxid, Calciumsalze der Stearinsäuren.

Analytische Bestandteile	
Calcium	27%
Magnesium	1,3%
Natrium	<0,1%
Phosphor	8,1%

Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
36671 Vitamin D3 233.000 IE/kg

Technologische Zusatzstoffe
12338 Calciumformiat 400.000 mg/kg

Fütterung
Minimale Dosierung
• 2 Bolii 12 bis 24 Stunden vor dem Abkalben oder unmittelbar nach dem Abkalben.

Zusätzliche Dosierung
• 1 oder 2 Bolii 10 bis 12 Stunden nach dem Kalben.
• 1 oder 2 Bolii 24 Stunden nach dem Kalben.
• 1 oder 2 Bolii bei Anzeichen eines Calciummangels.

Nach einer Kalziuminfusion
• 2 Bolii 2 bis 12 Stunden nach der Infusion.
• 1 oder 2 Bolii bei Anzeichen eines Calciummangels.

Gebruiksaanwijzing
• Verfüttern mit einem geeigneten Bolus-Applikator (Folie entfernen). Nicht an ein liegendes Tier verabreichen.
• Es wird empfohlen vor der ersten Anwendung den Rat eines Futtermittelexperten einzuholen.
• Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn eine oder mehrere davon an oder nahe der maximal zulässigen Konzentration verwendet werden.

Lagerungshinweise
Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen.

Jeder Bolus enthält 26,6 g Kalzium.

Mindestens haltbar bis
Siehe Verpackung.

Batch-Nr.
Siehe Verpackung.

FR
Aliment minéral diététique pour vaches laitières en forme de bolus pour administration orale, réduction du risque de fièvre vitulaire et d'hypocalcémie subclinique.

Application
Le bolus de Calcium Topro est un supplément de calcium rapidement disponible appliqué aux vaches à partir des premiers signes de vêlage jusqu'à 2 jours après vêlage.

Composition
Phosphate dicalcique, oxyde de magnésium, sels de calcium d'acides steariques.

Constituants analytiques	
Calcium	27%
Magnésium	1,3%
Sodium	<0,1%
Phosphore	8,1%

Additifs
Additifs nutritionnels
36671 Vitamine D3 233.000 UI/kg

Additifs technologiques
12338 Formate de calcium 400.000 mg/kg

Dosage
Dosage minimal
• 2 bolus 12 à 24 heures avant le vêlage ou immédiatement après le vêlage.

Dose supplémentaire
• 1 ou 2 bolus 10 à 12 heures après le vêlage.
• 1 ou 2 bolus 24 heures après le vêlage.
• 1 ou 2 bolus en cas de signes de carence en calcium.

Après une infusion de calcium
• 2 bolus 2 à 12 heures après la perfusion.
• 1 ou 2 bolus en cas de signes de carence en calcium.

Mode d'emploi
• Appliquer avec un lance-bolus adapté (retirer le film). Ne pas administrer à un animal couché.
• Avant son usage il est recommandé de demander l'avis d'un expert en nutrition animale.
• L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.

Conditions de stockage
Conserver frais et sec, hors de portée d'enfants. Protéger contre le gel.

Chaque bolus contient 26,6 g de calcium.

Date limite de conservation
Voir emballage.

No de lot
Voir emballage.

PL
Mieszkanka paszowa uzupełniająca dla krów mlecznych w formie bolusów do podawania doustnego, zmniejszenie ryzyka gorączki mlecznej i subklinicznej hipokalcaemii.

Zastosowanie
Topro-kalcium bolus jest szybko rozpuszczającym się suplementem wapnia dla krów mlecznych stosowany od wystąpienia pierwszych objawów cielienia do dwóch dni po wycieleniu.

Skład
Wodorofosforan wapnia, tlenek magnezu, sole wapniowe kwasów stearynowych.

Skład analityczny	
Wapń	27%
Magnez	1,3%
Sód	<0,1%
Fosfor	8,1%

Dodatki
Dodatki dietetyczne
36671 Witamina D3 233.000 IU/kg

Dodatki technologiczne
12338 Mrowian wapnia 400.000 mg/kg

Stosowanie
Dawkę minimalną
• 2 bolusy 12 do 24 godzin przed wycieleniem lub bezpośrednio po wycieleniu.

Dodatkowa dawka
• 1 lub 2 bolusy 10 do 12 godzin po wycieleniu.
• 1 lub 2 bolusy 24 godziny po wycieleniu.
• 1 lub 2 bolusy w przypadku objawów niedoboru wapnia.

Stosowanie po wlewie wapniowej
• 2 bolusy 2-12 godzin po wlewie.
• 1 lub 2 bolusy w przypadku objawów niedoboru wapnia.

Instrukcja użycia
• Podawać za pomocą aplikatora do bolusów (folię usunąć). Nie podawać leżącemu zwierzęciu.
• Przed podaniem zalecamy konsultację z lekarzem weterynaryj lub żywioznawcą.
• Jednocześnie stosowanie różnych kwasów organicznych lub ich soli jest przeciwwskazane, gdyż jeden lub więcej z nich jest stosowany na lub w pobliżu maksymalnego dopuszczalnego poziomu.

Instrukcja przechowywania
Trzymać w chłodnym, suchym miejscu poza zasięgiem dzieci. Chronić przed mrozem.

Każdy bolus zawiera 26,6 g wapnia.

Najlepiej spożyć do
na opakowaniu.

Numer partii
na opakowaniu.

SE
Dietetiskt mineralfoder för mjölkkor i form av en bolus för oral administrering, för att minska risken för mjölkfeber och subklinisk hypokalcaëmie.

Användning
Topro-kalciumbolusen är ett snabbt upplösande kalcium- tillskott administrerat till mjölkkor från de första tecknen på kalvning till två dagar efter kalvning.

Sammansättning
Dikalciumpfostfat, magnesiumoxid, kalciumsalter av stearinsyror.

Analytiska beståndsdelar och mängder	
Kalcium	27%
Magnesium	1,3%
Natrium	<0,1%
Fosfor	8,1%

Tillsatser
Närings tillsatser
36671 Vitamin D3 233 000 IE/kg

Tekniska tillsatser
12338 Kalciumformiat 400 000 mg/kg

Dosering
Minsta dosering
• 2 bolusdoser 12 till 24 timmar före kalvning eller omedelbart efter kalvning.

Ytterligare dosering
• 1 eller 2 bolusdoser 10 till 12 timmar efter kalvning.
• 1 eller 2 bolusar 24 timmar efter kalvning.
• 1 eller 2 bolusdoser vid tecken på kalciumbrist.

Dosering efter en kalciuminfusion
• 2 bolusar 2-12 timmar efter infusion.
• 1 eller 2 bolusdoser vid tecken på kalciumbrist.

Användningsinstruktioner
• Administrera med en lämplig bolusapplicator (ta bort folien). Administrera inte till ett liggande djur.
• Före användning rekommenderar vi att du tar råd från en veterinär eller nutritionist.
• Samtidig användning av olika organiska syror eller deras salter är kontraindicerad när en eller flera av dem används vid eller nära den maximalt tillåtna halten.

Lagringsanvisningar
Förvara produkten svalt, torrt och utom räckhåll för barn. Skydda mot frost.

Varje bolus innehåller 26,6 g kalcium.

Bäst före
Se förpackning.

Batch nr
Se förpackning.



12 x 95 g

Calcium

Met fosfor en vitamine D3
with phosphorus and vitamin D3

Topro: eingetragene Marke von

Farmula
farming forward

Farmula GmbH
Eper Straße 3
D-48599 Gronau
info@farmula.de www.farmula.de

Erkenningsnr. Producent
Registration No. manufacturer
Zulassungs-Nr. Hersteller
No agrément du producteur
αFR24037002

GMP+ FSA geborgd
GMP+ FSA assured
Garanti GMP+ FSA
GMP+ FSA gesichert

Gwarancja GMP+ FSA
GMP+ FSA gwarantat
GMO controlled
PDV103322

