



330 g / 300 ml

CarboGel

Aanvullend diervoeder - Complementary feed -
Ergänzungsfuttermittel - Aliment complémentaire

NL

Ter ondersteuning bij het dikker maken van de mest.

Samenstelling water (62,7%), plantaardige koolstof, natriumchloride, kaliumchloride, propyleenglycol, maïzetmeelsiroop.

Toevoegingsmiddelen conserveermiddelen: Natriumpropionaat 1k281 (25000mg/kg); Emulgatoren, stabilisatoren, verdikkingsmiddelen en geleermiddelen: carboxymethylcellulose (natriumzout van carboxymethylether van cellulose) E466 (16000mg/kg), xanthangom E 415 (10000mg/kg); mengsel van aromatische stoffen (60mg/kg); Bindmiddelen, verdunningsmiddelen en stollingsmiddelen: kiezelzuur, neergeslagen en gedroogd E551a (60mg/kg). **Analytische bestanddelen** ruwe celstof 20,8%, ruwe as 2,6%, ruw eiwit 0%, ruw vet 0%, lysine 0%, methionine 0%, natrium 0,9%. **Gebruiksaanwijzing en dosering** 's Ochtdens en 's avonds toedienen voor 2 à 3 dagen. 1) Plaats de tube in het speciale handpistool, 2) De kop van het dier vastpakken en iets omhoog houden, 3) De opening van de tube achter in de bek, op het midden van de tong plaatsen. Toedienen met een geschikte applicator. (1x knijpen = 15ml). Kalveren: 2 x knijpen; Schapen/Geiten: 2 x knijpen; Lammeren: 0,5 x knijpen;

Gespeende biggen: 0,5 x knijpen; Biggen ± 25 kg: 1 x knijpen. Niet toedienen aan zieke of verzwakte dieren. Stop met het toedienen van het product in het geval van buien. **Bewaaraadvies** Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

EN

To support the thickening of the manure.

Composition water (62.7%), vegetal carbon, sodium chloride, potassium chloride, propylene glycol, corn starch syrup. **Additives** preservatives: Sodium propionate 1k281 (25000mg/kg); Emulsifiers, stabilizers, thickeners and gelling agents: Carboxymethylcellulose (Sodium salt of carboxymethyl ether of cellulose) E 466 (16000mg/kg), xanthan gum E 415 (10000mg/kg); mixture of flavouring compounds (60mg/kg); Binders, anti-caking agents and coagulants: Silicic acid, precipitated and dried E 551a (60mg/kg). **Analytical constituents** crude fibre 20.8%, crude ash 2.6%, crude protein 0%, crude protein 0%, lysine 0%, methionine 0%, sodium 0.9%. **Instructions for use and dosage** Administer in the morning and evening for 2 or 3 days. 1) Slightly lift the animal's head, 2) Enter the cartridge into

the mouth to the center of the tongue, 3) Pump. Administer with a suitable applicator. (1 stroke: 15 ml). Calves: 2 strokes; Sheep/Goats: 2 strokes; Lambs 0,5 stroke; Weaners: 0.5 stroke; Pigs ± 25 kg: 1 stroke. Do not feed to sick immobile animals. Interrupt feeding if the animal shows a false swallowing reflex. **Storage instructions** Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost.

DE

Zur Unterstützung der Verdickung des Mistes.

Zusammensetzung Wasser (62,7%), Pflanzliche Kohle, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Propylenglycol, Maïsstärkeisiroop. **Zusatzstoffe** Konservierungsstoffe: Natriumpropionat 1k281 (25000mg/kg); Emulgatoren, Stabilisatoren, Verdickungs- und Geliermittel: Carboxymethylcellulose (Natriumsalz des Cellulosecarboxymethylethers) E466 (16000mg/kg), Xanthangummi E 415 (10000mg/kg); Mischung aus Aromastoffen (60mg/kg); Bindemittel, Fließhilfsstoffe und Gerinnungshilfsstoffe: Kieselsäure, gefällt und getrocknet E 551a (60mg/kg). **Analytische Bestandteile** Rohfaser 20,8%, Rohasche 2,6%, Rohprotein 0%, Rohfett 0%, Lysin 0%, Methionin

0%, Natrium 0,9%. **Gebrauchsanweisung und Fütterung** Morgens und abends 2 bis 3 Tage lang verabreichen. 1) Kopf des Tieres anheben, 2) Kartuschenöffnung in den Mund stecken, bis zur Zungenmitte, 3) Pumpen. Verfüterung mit einem geeigneten Applikator. (1 Pumpenstoss = 15ml). Kälber: 2 Stöße; Schafe/Ziegen: 2 Stöße; Lämmer: 0,5 Stoss; Absetzferkel: 0,5 Stoss; Ferkel ± 25 kg: 1 Stoss. Nicht an kranken immobilen Tieren verabreichen. Anwendung abbrechen, wenn sich das Tier verschluckt. **Lagerungshinweise** Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen.

FR

Pour favoriser l'épaississement du fumier.

Composition eau (62,7%), charbon végétal, chlorure de sodium, chlorure de potassium, propylène glycol, sirop d'amidon de maïs. **Additifs** conservateurs: Propionate de sodium 1k281 (25000mg/kg); Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants: Carboxyméthylcellulose (Sel sodique de l'éther carboxyméthyle de cellulose) E466 (16000mg/kg), gomme xanthane E 415 (10000mg/kg); mélange des substances aromatiques (60mg/kg);

Agents liants, antimottants et coagulants: Acide silicique précipité et séché E 551a (60mg/kg). **Constituants analytiques** cellulose brute 20,8%, cendres brutes 2,6%, protéine brute 0%, matières grasses brutes 0%, lysine 0%, méthionine 0%, sodium 0,9%. **Mode d'emploi et dosage** Administrer le matin et le soir pendant 2 ou 3 jours. 1) Prendre et étendre délicatement la tête de l'animal, 2) Mettre l'ouverture de la cartouche dans la bouche au centre de la langue, 3) Presser. Appliquer avec un lance adapté. (1 pression = 15 mL). Veaux: 2 pressions; Ovins/Caprins: 2 pressions; Agneaux: 0,5 pression; Porcs sevrages: 0,5 pression; Porcs ± 25 kg: 1 pression. Ne pas administrer aux animaux léthargiques. Arrêter l'administration du produit en cas de fausse déglutition. **Conditions de stockage** Conserver frais et sec, hors de portée d'enfants. Protéger contre le gel.

Best before see packaging.

Batch No. see packaging.

GMP+ FSA assured - GMO controlled -
PDV103322 - Approval number producer
aFR16089043



Topro: registered trademark of

Farmula
farming forward

Farmula B.V.

Sluiskolk 3-5
7681 KC Vroomshoop NL
info@topro.nl www.topro.nl