



Dry minerala

Sporenelementen en vitamines, 60 dagen | Trace elements and vitamins, 60 days

Ter ondersteuning tijdens de droogstand periode
To support during the dry period
Zu unterstützen während die Trockenzeit
Pour soutenir pendant la période de sécheresse
Do wsparcia w okresie suchym
För att stödja under torrperioden

12 x 120 g



NL
Mineraal diëetvoeder voor rundvee in de vorm van een bolus voor orale toediening.

Affigeduur
Geleidelijke afgifte van sporenelementen en vitamines gedurende 60 dagen.

Samenstelling
plantage, plantaardig vet van koolzaad, calciumzouten van stearinezuur.

Analytische bestanddelen	
Calcium	0,4%
Fosfor	<0,1%
Natrium	0,1%
Magnesium	0,1%

Toevoegingsmiddelen
Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg
3b202 Jodium (calciumjodaat, waterig) 12,400 mg (24,8 mg*), 3b302 Kobalt (kobalt(II)carbonaat) 4,160 mg (8,3 mg*), 3b404 Koper (koper(II)oxide) 50,250 mg (100,5 mg*), 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide) 142,600 mg (285,2 mg*), 3b603 Zink (zinkoxide) 150,220 mg (300,4 mg*), 3b801 Selenium (natriumseleniet) 1,840 mg (3,7 mg*), 3a672b Vitamine A 12,500,000 IE (25,000 IE*), 3a671 Vitamine D3 2,750,000 IE (5,500 IU*), 3a700b Vitamine E 80,000 IE (160,0 IU*)
* Dagelijkse afgifte 1 bolus gedurende 60 dagen

Dosering
• Melkvee: bij droogzetten 1 Dry bolus toedienen.
• Ziekvee: 2 maanden voor afkalven 1 Dry bolus toedienen.
• Niet toedienen aan jongvee beneden de 400 kg. Gebruik hiervoor de Opti Trace (Junior) bolus.

Gebruiksaanwijzing
• Toedienen met een geschikte bolusschier (folie verwijderen).
• Aanraderen wordt om vóór gebruik het advies van een dierenarts of voederspecialist in te winnen met betrekking tot:
1. de balans van de sporenelementen in het dagelijks rantsoen;
2. de status van het beslag met betrekking tot sporenelementen.
• Voor zover van toepassing moet worden vermeden dat uit andere bronnen toevoegingsmiddelen waarvoor een maximum-dosis is vastgesteld gelijktijdig worden toegediend met die van een bolus.
• Er moeten beschermende maatregelen worden genomen om blootstelling aan kobalt door inademing of via de huid te vermijden.

Bewaarsadvies
Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

Tenminste houdbaar tot
zie verpakking.

Batchnr.
zie verpakking.

Batchnr.
zie verpakking.

EN
Dietetic mineral feed for cattle in the form of a bolus for oral administration.

Release duration
Gradual release of trace elements and vitamins over a period of 60 days.

Composition
iron (ballast), vegetable fat from rapeseed, calcium salts of stearic acids.

Analytical constituents and amounts	
Calcium	0,4%
Phosphorus	<0,1%
Sodium	0,1%
Magnesium	0,1%

Additives
Nutritional additives per kg
Iodine (anhydrous calcium iodate) 12,400 mg (24,8 mg*), 3b302 Cobalt (cobalt(II) carbonate) 4,160 mg (8,3 mg*), 3b404 Copper (copper(II)oxide) 50,250 mg (100,5 mg*), 3b502 Manganese (manganese(II) oxide) 142,600 mg (285,2 mg*), 3b603 Zinc (zinc oxide) 150,220 mg (300,4 mg*), 3b801 Selenium (sodium selenite) 1,840 mg (3,7 mg*), 3a672b Vitamin A 12,500,000 IU (25,000 IE*), 3a671 Vitamin D3 2,750,000 IU (5,500 IU*), 3a700b Vitamin E 80,000 IU (160,0 IU*)
* Daily release 1 bolus per kg per 60 days

Dosage
• Dairy cattle: administer 1 Dry bolus at the start of the dry period.
• Suckler cows: Administer 1 Dry bolus 2 months before calving.
• Do not administer to young livestock weighing less than 400 kg. In that case, administer the Opti Trace (Junior) bolus.

Instructions for use
• Administer using a suitable bolus applicator (remove foil).
• It is recommended that a veterinarian's or nutritionist's opinion be sought before use, with regard to:
1. the balance of trace elements in the daily ration;
2. the trace elements status of the herd.
• Simultaneous supplementation of additives with a maximum content from other sources to those incorporated in a bolus must be avoided.
• Protective measures must be taken to avoid exposure to cobalt through inhalation or through the skin.

Storage instructions
Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost.

Best before
See packaging.

Batch No.
See packaging.

Batch-Nr.
Siehe Verpackung.

DE
Diätetisches Mineralfuttermittel für Rinder in Form eines Bolus zur oralen Verabreichung.

Veröffentlichungsdauer
Allmähliche Freigabe von Spurenelementen und Vitaminen bis zu 60 Tage.

Zusammensetzung
Eisen (Ballast), Rapsöl, Calciumsalze der Stearinsäuren.

Analytische Bestandteile	
Calcium	0,4%
Phosphor	<0,1%
Natrium	0,1%
Magnesium	0,1%

Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg 3b202 Jod (wasserfreies Kalziumjodat) 12,400 mg (24,8 mg*), 3b302 Kobalt (Kobalt(II)karbonat) 4,160 mg (8,3 mg*), 3b404 Kupfer (Kupfer(II)oxid) 50,250 mg (100,5 mg*), 3b502 Mangan (Mangan(II)oxid) 142,600 mg (285,2 mg*), 3b603 Zink (Zinkoxid) 150,220 mg (300,4 mg*), 3b801 Selen (Natriumselenit) 1,840 mg (3,7 mg*), 3a672b Vitamin A 12,500,000 IE (25,000 IE*), 3a671 Vitamin D3 2,750,000 IU (5,500 IU*), 3a700b Vitamin E 80,000 IE (160,0 IU*)
* 1 Bolus gibt täglich über 60 Tage ab

Fütterung
• Milchkuhe: 1 Dry Bolus zu Beginn der Trockenzeit.
• Mutterkuhe: 1 Dry Bolus 2 Monate vor der Kalbung.
• Nicht geeignet für Kühe mit einem Gewicht unter 400 kg. Verwenden Sie dazu den Opti Trace (Junior) Bolus.

Gebrauchsanweisung
• Verfüllung mit einem geeigneten Bolus-Applikator (Folie entfernen).
• Es wird empfohlen vor der ersten Anwendung den Rat eines Futtermittelexperten einzuholen zu:
1. der Ausgewogenheit der Tagesration in Bezug auf Spurenelemente;
2. dem Status des Bestands der Herde in Bezug auf Spurenelemente.
• Die gleichzeitige Supplementierung von Zusatzstoffen mit einem Höchstgehalt aus anderen Quellen als einem Bolus ist zu vermeiden.
• Es müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um eine Exposition gegenüber Kobalt durch Einatmen oder durch die Haut zu vermeiden.

Lagerungshinweise
Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen.

Mindestens haltbar bis
Siehe Verpackung.

Batch-Nr.
Siehe Verpackung.

Batch-Nr.
Siehe Verpackung.

FR
Aliment minéral diététique pour bovins, en forme de bolus pour administration orale.

Durée de libération
Libération progressive d'oligo éléments et de vitamines pendant 60 jours.

Composition
Fer (ballast), matières grasses végétales du colza, sels de calcium d'acides stéariques.

Constituants analytiques	
Calcium	0,4%
Phosphore	<0,1%
Sodium	0,1%
Magnésium	0,1%

Additifs
Additifs nutritionnels par kg
3b202 Jode (iodate de calcium anhydre) 12,400 mg (24,8 mg*), 3b302 Cobalt (carbonate de cobalt(II)) 4,160 mg (8,3 mg*), 3b404 Cuivre (oxyde de cuivre(II)) 50,250 mg (100,5 mg*), 3b502 Manganèse (oxyde de manganèse(II)) 142,600 mg (285,2 mg*), 3b603 Zinc (oxyde de zinc) 150,220 mg (300,4 mg*), 3b801 Sélénium (sélénite de sodium) 1,840 mg (3,7 mg*), 3a672b Vitamine A 12,500,000 IU (25,000 IU*), 3a671 Vitamine D3 2,750,000 IU (5,500 IU*), 3a700b Vitamine E 80,000 IU (160,0 IU*)
* Administration quotidienne 1 bolus pendant 60 jours

Dosage
• Bétail laitier: 1 bolus Dry au tarissement.
• Vaches allaitantes: 1 bolus Dry deux mois avant le vêlage.
• Ne pas administrer au bétail jeune de moins de 400 kg. Utiliser le bolus Opti Trace (Junior) à cet effet.

Mode d'emploi
• Appliquer avec un lance-bolus adapté (retirer le film).
• Avant l'utilisation, il est recommandé de demander conseil auprès d'un vétérinaire ou d'un expert en nutrition animale au sujet:
1. du dosage des oligoéléments dans la ration journalière;
2. du statut en oligoéléments du troupeau.
• La supplémentation simultanée en additifs présentant une teneur maximale à partir de sources autres que celles incorporées dans un bolus doit être évitée.
• Des mesures de protection doivent être prises pour éviter l'exposition au cobalt par inhalation ou par la peau.

Conditions de stockage
Conserver frais et sec, hors de portée d'enfants. Protéger contre le gel.

Date limite de conservation
Voir emballage.

No de lot
Voir emballage.

No de lot
Voir emballage.

PL
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla bydła w formie bolusów do podawania doustnego.

Czas trwania wydania
powsolne uwalnianie mikroelementów i witamin przez okres 60 dni.

Skład
Żelazo (ballast) olej rzepakowy, sole wapniowe kwasów stearynowych.

Skład analityczny	
Wapń	0,4%
Fosfor	<0,1%
Sód	0,1%
Magnez	0,1%

Dziennic
Uwalnianie na kg
3b202 Jod (dwuwodny jodan wapniowy) 12,400 mg (24,8 mg*), 3b302 Kobalt (kobalt(II) karbonat) 4,160 mg (8,3 mg*), 3b404 miedź (tlenek miedzi(II)) 50,250 mg (100,5 mg*), 3b502 Mangan (tlenek manganu(II)) 142,600 mg (285,2 mg*), 3b603 Cynk (tlenek cynku) 150,220 mg (300,4 mg*), 3b801 Selen (selen sodu) 1,840 mg (3,7 mg*), 3a672b Witamina A 12,500,000 IU (25,000 IU*), 3a671 Witamina D3 2,750,000 IU (5,500 IU*), 3a700b Witamina E 80,000 mg (160,0 mg*)
* Jeden bolus przez okres 60 dni

Stosowanie
• Jółowka: podawać 1 bolus na początku okresu zaszczenia.
• Krowa: podawać 1 bolus 2 miesiące przed wycieleniem.
• Nie podawać młodemu bydłu wazacemu mniej niz 400 kg, im podawać Opti Trace (Junior) bolus.

Instrukcja podawania
• Podawać z pomocą odpowiedniego aplikatora do bolusów (folie usunąć).
• Zaleca się konsultację z lekarzem weterynaryjnym lub żywiołowncem przed podaniem w zakresie:
1. Równowagi mikroelementów w dziennej dawce pokarmowej;
2. Bilansu mikroelementów słodowych w stadzie.
• Należy unikać równoczesnej suplementacji dodatków pochodzących z innych źródeł z maksymalną zawartością składników już zawartych w bolusie.
• Należy zastosować środki ochronne w celu uniknięcia ekspozycji na kobalt poprzez inhalację lub skórę.

Instrukcja przechowywania
Trzymać w chłodnym, suchym miejscu poza zasięgiem dzieci. Chronić przed mrozem.

Najlepiej spożyć do
na opakowaniu.

Numer partii
na opakowaniu.

Numer partii
na opakowaniu.

SE
Diätetisk mineralfoder för nötkreatur i form av en bolus för oral administrering.

Frigöringstid
Gradvis frisättning av spårämnen och vitaminer över en period av 60 dagar.

Sammanfattning
Järn (ballast), vegetabiliskt fett från rapsfrö, kaliumsalter av stearinsyror.

Analytiska beståndsdelar och mängder	
Kalcium	0,4%
Fosfor	<0,1%
Natrium	0,1%
Magnesium	0,1%

Tillsatser
Näringsstillsatser per kg
3b202 Jod (kalciumjodat (vattenfri)) 12,400 mg (24,8 mg*), 3b302 Kobolt (kobalt(II) karbonat) 4,160 mg (8,3 mg*), 3b404 Koppar (koppar(II)oxid) 50,250 mg (100,5 mg*), 3b502 Mangan (mangan(II)oxid) 142,600 mg (285,2 mg*), 3b603 Zink (zinkoxid) 150,220 mg (300,4 mg*), 3b801 Selen (natriumselenit) 1,840 mg (3,7 mg*), 3a672b Vitamin A 12,500,000 IE (25,000 IE*), 3a671 Vitamin D3 2,750,000 IE (5,500 IE*), 3a700b Vitamin E 80,000 mg (160,0 mg*)
* Daglig frisättning 1 bolus per kg per 60 dagar

Dosering
• Mylkkoisag: Administrera 1 bolus i början av sinperoden.
• Ammkor: Administrera 1 bolus 2 månader före kalvning.
• Administrera inte till unga djur som väger mindre än 400 kg. Lå fall administrera Opti Trace (Junior) Bolus.

Användningsinstruktioner
• Administrera med en lämplig Bolusapplikator (ta bort folie).
• Före användning bör en veterinär eller näringsexpert rådfrågas om a) balansen av spårämnen i dagsbeholdet, b) besättningsens status i fråga om spårämnen.
• Samtidigt tillförsel av tillsatser med en högsta tillåtna halt från andra källor än sådana som ingår i en bolus ska i förekommande fall undvikas.
• Skyddsåtgärder bör vidtas för att undvika exponering för kobolt genom inandning eller genom huden.

Lagringsanvisningar
Förvara produkten sval, torrt och utom räckhåll för barn. Skydda mot frost.

Bäst före
Se förpackning.

Batch nr.
Se förpackning.

Batch nr.
Se förpackning.



12 x 120 g

Dry Mineral

Sporenelementen en vitamines, 60 dagen
Trace elements and vitamins, 60 days

Topro: eingetragene Marke von

Farmula
farming forward

Farmula GmbH
Eper Straße 3
D-48599 Gronau
info@farmula.de
www.farmula.de

Erkenningsnr. Producent
Registration No. manufacturer
Zulassungs-Nr. Hersteller
No agrément du producteur
αFR24037002

GMP+ FSA geborgd
GMP+ FSA assured
Garanti GMP+ FSA
GMP+ FSA gesichert


Gwarancja GMP+ FSA
GMP+ FSA garantat
GMO controlled
PDV103322



1



2



3