



animal health
topro



Ondersteunt de voorbereiding op tochtigheid en reproductie
Supports the preparation for oestrus and reproduction
Unterstützt die Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion
Soutient la préparation à l'oestrus et la reproduction
Met betacaroteen, 8 dagen | With beta carotene, 8 days

Fertility

6 001 x Z1



NL

Mineraal dietvoeder voor rundvee in de vorm van een bolus voor orale toediening ter ondersteuning van de voorbereiding op tochtigheid en reproductie.

Afgifteduur

Geleidelijke afgifte van sporenelementen en vitamines gedurende 8 dagen.

Samenstelling

Ijzer (ballast), plantaardig vet van koolzaad, calciumzouten van stearinezuur, Siberische ginsengwortel, gemberwortelpoeder, poeder van vloeikruid (Canadaes), winterbomenkruidblad, ginsengwortel.

Analytische bestanddelen

Calcium 0,5%, magnesium 0,1%, fosfor <0,1%, natrium 0,1%

Toevoegingsmiddelen

Nutritionele toevoegingsmiddelen
3b202 Iodium (watervrij calciumjodaat) 6.200 mg (77,5 mg*), 3b302 Kobalt (kobalt(II)carbonaat) 1.040 mg (13,0 mg*), 3b404 Koper (koper(II)oxide) 15.000 mg (187,5 mg*), 3b413 Koper (koper(II)cheleaat van glycine hydraat) 23.040 mg (288 mg*), 3b502 Mangaan

(mangaan(II)oxide) 80.600 mg (1.007,5 mg*), 3b506 Mangaan (mangaanchelaat van glycine hydraat) 21.390 mg (267,4 mg*), 3b603 Zink (zinkoxide) 81.400 mg (1.017,5 mg*), 3b607 Zink (zinkchelaat van glycine hydraat) 27.000 mg (337,5 mg*), 3b801 Selenium (natriumseleniet) 506 mg (6,3 mg*), 3a672a Vitamine A 5.000.000 IE (62.500 IE*), 3a700i Vitamine E 48.000 IE (600 IE*), 3a160(a) Beta caroteen 24.000 mg (300 mg*)

Sensoriële toevoegingsmiddelen
aromatische en smakelijke stoffen

* Dagelijkse afgifte 1 bolus gedurende 8 dagen

Dosering

• Dairy cattle: 1 Fertility bolus 8-10 dagen voor inseminatie.

• Zoogkoeien: 1 Fertility bolus 8-10 dagen voor dekking of inseminatie.

• Niet toedienen aan rundvee onder de 250 kg.
• Geen 2 Fertility bolussen tegelijk toedienen.

Bewaren
Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

Batchnr.

Zie verpakking.

Gebruiksaanwijzing

- Toedienen met een geschikte bolusschietter (folie verwijderen).
- Aangeraden wordt om voor gebruik het advies van een dierenarts of voederdeskundige in te winnen met betrekking tot:
 1. de balans van de sporenelementen in het dagelijks rantsoen;
 2. de status van het beslag met betrekking tot sporenelementen
- Voor zover van toepassing moet worden vermeden dat uit andere bronnen toevoegingsmiddelen waarvoor een maximumgehalte is vastgesteld gelijktijdig worden toegediend met die van een bolus.
- Er moeten beschermende maatregelen worden genomen om blootstelling aan kobalt door inademing of via de huid te vermijden.

Bewaren

Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

Tenminste houdbaar tot

Zie verpakking.

Batchnr.

Zie verpakking.

FR

Aliment minéral diététique pour bovins forme de bolus pour préparation à l'oestrus et à la reproduction.

Durée de libération

Libération progressive pendant 8 jours.

Composition

Fer (ballast), matières grasses végétales du colza, sels de calcium d'acides stéariques, racine de ginseng de Sibérie, poudre de racine de gingembre, poudre d'érigeron du Canada, feuille de sarriette d'hiver, racine de ginseng.

Constituants analytiques

Calcium 0,5%, magnésium 0,1%, phosphore <0,1%, sodium 0,1%

Additifs

Additifs nutritionnels par kg

3b202 Iode (iodate de calcium anhydre) 6.200 mg (77,5 mg*), 3b302 Cobalt (carbonate de cobalt(II)) 1.040 mg (13,0 mg*), 3b404 Cuivre (oxyde de cuivre(II)) 15.000 mg (187,5 mg*), 3b413 Cuivre (chélate cuivreux de glycine hydrate(II)) 23.040 mg (288 mg*), 3b502 Manganèse (oxyde de manganèse(II)) 80.600 mg

(1.007,5 mg*), 3b506 Manganèse (chélate mangaueux de glycine hydrate) 21.390 mg (267,4 mg*), 3b603 Zinc (oxyde de zinc) 81.400 mg (1.017,5 mg*), 3b607 Zinc (chélate de zinc de glycine hydrate) 27.000 mg (337,5 mg*), 3b801 Sélénium (sélénite de sodium) 506 mg (6,3 mg*), 3a672a Vitamine A 5.000.000 UI (62.500 UI*), 3a700i Vitamine E 48.000 UI (600 UI*), 3a160(a) Béta-carotène 24.000 mg (300 mg*)

* Administration quotidienne 1 bolus pendant 8 jours

Dosage

• Vaches laitières: 1 bolus Fertility 8-10 jours avant insémination.

• Vaches allaitantes: 1 bolus Fertility 8-10 jours avant saillie ou insémination.

• Ne pas administrer au bétail de moins de 250 kg.

• Ne pas administrer 2 bolus Fertility à la fois.

Mode d'emploi

• Appliquer avec un lance-bolus adapté (retirer le film).

• Avant l'utilisation, il est recommandé de demander conseil auprès d'un vétérinaire ou d'un expert en nutrition animale au sujet:

1. du dosage des oligoéléments dans la ration journalière;

2. du statut en oligoéléments du troupeau.

• La supplémentation simultanée en additifs présentant une teneur maximale à partir de sources autres que celles incorporées dans un bolus doit être évitée.

• Des mesures de protection doivent être prises pour éviter l'exposition au cobalt par inhalation ou par la peau.

Conservation

Conserver frais et sec, hors de portée d'enfants. Protéger contre le gel.

Date limite de conservation

Herde in Bezug auf Spurenelemente

• Die gleichzeitige Supplementation von Zusatzstoffen mit einem Höchstgehalt aus anderen Quellen als einem Bolus ist zu vermeiden.

• Es müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um eine Exposition gegenüber Kobalt durch Einatmen oder durch die Haut zu vermeiden.

Lagerungshinweise

Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen.

Mindestens haltbar bis

Siehe Verpackung.

Batch-Nr.

Siehe Verpackung.

EN

Diets mineral feed for cattle in the form of a bolus for oral administration, to support the preparation for oestrus and reproduction.

Release duration

Gradual release of trace minerals and vitamins over an 8-day period.

Composition

Iron (ballast), vegetable fat from rapeseed, calcium salts of stearic acids, Siberian ginseng root, ginger powder, powder of fleabane (Canadian), winter savory leaf, ginseng root

Analytical constituents and amounts

Calcium 0.5%, magnesium 0.1%, phosphorus <0.1%, sodium 0.1%

Additives

Nutritional additives per kg
3b202 Iodine (anhydrous calcium iodate) 6.200 mg (77.5 mg*), 3b302 Cobalt (cobalt(II) carbonate) 1.040 mg (13.0 mg*), 3b404 Copper (copper(II) oxide) 15.000 mg (187.5 mg*), 3b413 Copper (copper(II) chelate of glycine hydrate) 23.040 mg (288 mg*), 3b502 Manganese (manganese(II) oxide) 80.600 mg (1.007.5 mg*),

3b506 Manganese (manganese chelate of glycine hydrate) 21.390 mg (267.4 mg*), 3b603 Zinc (zinc oxide) 81.400 mg (1.017.5 mg*), 3b607 Zinc (zinc chelate of glycine hydrate) 27.000 mg (337.5 mg*), 3b801 Selenium (sodium selenite) 506 mg (6.3 mg*), 3a672a Vitamin A 5.000.000 IU (62.500 IU*), 3a700i Vitamin E 48.000 IU (600 IU*), 3a160(a) Beta-carotene 24.000 mg (300 mg*)

* Daily release 1 bolus per kg per 8 days

Dosage

• Dairy cattle: 1 Fertility bolus 8-10 days before insemination.

• Suckler cows: 1 Fertility bolus 8-10 days before reproduction or insemination.

• Do not administer to young livestock weighing less than 250 kg.

• Do not administer 2 Fertility boluses at once.

Instructions for use

- Administer with a suitable bolus applicator (remove foil).
- It is recommended that a veterinarian's or nutritionist's opinion be sought before use, with regard to:
 1. The balance of trace elements in the daily ration;
 2. The trace elements status of the herd
- Simultaneous supplementation of additives with a maximum content from other sources to those incorporated in a bolus must be avoided.
- Protective measures must be taken to avoid exposure to cobalt through inhalation or through the skin.

Storage instructions

Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost.

Best before

See packaging.

Batch No.

See packaging.

DE

Diätisches Mineralfuttermittel für Rinder in Form eines Bolus, zur oralen Verabreichung, zur Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion.

Verfütterungsdauer

Allmähliche Freigabe von Spurenelementen und Vitaminen bis zu 8 Tage.

Zusammensetzung

Eisen (Ballast), Rapsöl, Calciumsalze der Stearinsäure, sibirische Ginsengwurzel, Ingwerwurzelpulver, Kanadisches Berufkrautpulver, Winterbohnenkrautblatt, Ginsengwurzel.

Analytische Bestandteile

Calcium 0,5%, Magnesium 0,1%, Phosphor <0,1%, Natrium 0,1%

Zusatzstoffe

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg
3b202 Jod (Calciumjodat wasserfrei) 6.200 mg (77,5 mg*), 3b302 Kobalt (Kobalt(II)carbonat) 1.040 mg (13,0 mg*), 3b404 Kupfer (Kupfer(II) oxid) 15.000 mg (187,5 mg*), 3b413 Kupfer (Glycin-Kupferchelate-Hydrat) 23.040 mg (288 mg*), 3b502 Mangan (Mangan(II)oxid) 80.600 mg

(1.007,5 mg*), 3b506 Mangan (Glycin-Manganchelate-Hydrat) 21.390 mg (267,4 mg*), 3b603 Zink (Zinkoxid) 81.400 mg (1.017,5 mg*), 3b607 Zink (Glycin-Zinkchelate-Hydrat) 27.000 mg (337,5 mg*), 3b801 Selen (Natriumselenit) 506 mg (6,3 mg*), 3a672a Vitamin A 5.000.000 IE (62.500 IE*), 3a700i Vitamin E 48.000 IE (600 IE*), 3a160(a) Beta-Carotin 24.000 mg (300 mg*)

* 1 Bolus gibt täglich über 8 Tage ab

Fütterung

• Milchkuhe: 1 Fertility bolus 8-10 Tage bevor Insemination.

• Mutterkuhe: 1 Fertility bolus 8-10 Tage bevor Deckung oder Insemination.

• Nicht geeignet für Kühe mit einem Gewicht unter 250 kg.

• Keine zwei Fertility Bolus gleichzeitig verabreichen.

Gebrauchsanweisung

• Verfütteln mit einem geeigneten Bolus-Applikator (folie entfernen).

• Es wird empfohlen vor der ersten Anwendung den Rat eines Futtermittelexperten einzuholen zu:

1. der Ausgewogenheit der Ration

2. dem Status des Bestands der Herde in Bezug auf Spurenelemente

• Die gleichzeitige Supplementation von Zusatzstoffen mit einem Höchstgehalt aus anderen Quellen als einem Bolus ist zu vermeiden.

• Es müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um eine Exposition gegenüber Kobalt durch Einatmen oder durch die Haut zu vermeiden.

Lagerungshinweise

Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen.

Mindestens haltbar bis

Siehe Verpackung.

Batch-Nr.

Siehe Verpackung.



12 x 100 g

Fertility

Met bètacaroteen, 8 dagen
With beta carotene, 8 days

Topro: eingetragene Marke von

Farmula
farming forward

Farmula GmbH
Eper Straße 3
D-48599 Gronau
info@farmula.de
www.farmula.de

Erkenningsnr. Producent
Registration No. manufacturer
Zulassungs-Nr. Hersteller
No agrément du producteur
αFR24037002

GMP+ FSA geborgd
GMP+ FSA assured
GMP+ FSA gesichert

Garanti GMP+ FSA
GMO controlled
PDV103322




 **topro**
animal health



1



2



3