

#### Zusammensetzung

Magermilchpulver, raffiniertes pflanzliches Öl (Palm/  
Kokos), Molkepulver, Nebenprodukte der Milchindustrie,  
vorverkleistertes Weizenmehl, Dextrose, entsäueretes  
Molkepulver, Weizenmehl, Calciumcarbonat,  
Magnesiumsulfat-Monohydrat, Natriumsalze der  
Buttersäure, Inulin (Chicorée), Kolostrumpulver.

#### Analytische Bestandteile

Rohprotein 23,0%, Rohfett 23,0%, Rohasche 7,1%,  
Rohfaser 0,0%, Phosphor 0,68%, Calcium 1,1%, Natrium  
0,40%, Lysin 1,70%.

#### Zusatzstoffe pro kg

##### Vitamine

3a672a Vitamin A 25.000 I.E., 3a671 Vitamin D3 2.000 I.E.,  
3a700i Vitamin E 200 mg, 3a700ii Vitamin E 100 mg.

##### Spurenelemente

3b103 Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 30 mg,  
3b503 Mangan (Mangan(II)-sulfat-Monohydrat) 45 mg,  
3b605 Zink (Zinksulfat-Monohydrat) 84 mg,  
3b201 Jod (Kaliumjodid) 2 mg,  
3b811 Selen (Selenmethionin, produziert durch  
Saccharomyces cerevisiae NCYC R397) 0,2 mg,  
3b801 Selen (Natriumselenit) 0,1 mg

##### Antioxidationsmittel

E310 Propylgallat 4 mg,  
1b320 Butylhydroxyanisol (BHA) 4 mg

##### Konservierungsmittel

E202 Kaliumsorbit 9 g

#### Gebrauchsanweisung und Dosierung

Schaflämmer: Mischungsverhältnis 1:5 (für 1 Liter Milch 165 g Pulver auf 835 g Wasser)

Ziegenlämmer: Mischungsverhältnis 1:6 (für 1 Liter Milch 145 g Pulver auf 855 g Wasser)



1,75 kg

# Lämmer-milch

Vollständiger Milchaustauscher  
zur Aufzucht von Schaf- und  
Ziegenlämmern

Lösen Sie das Pulver in der Hälfte der benötigten Was-  
sermenge bei 65 °C auf. Kräftig mit einem Schneebesen  
verrühren. Kaltes Wasser (20 °C) hinzufügen, bis das  
gewünschte Mischungsverhältnis erreicht ist. Die angerührte  
Milch ist einen Tag haltbar.  
Verabreichen Sie Topro Lämmermilch über eine Lämmerbar (Vorratsfütterung, Trinktemperatur entspricht Stalltemper-  
atur) oder mit einer Saugerflasche (Trinktemperatur 40 °C).  
Am ersten Tag Kolostrum geben, danach unbegrenzt Topro  
Lämmermilch anbieten.

Tag	Anzahl Fütterungen	Menge pro Fütterung
1. Tag	6	60 ml Kolostrum
2. bis 4. Tag	4	125 ml Lämmermilch
5. bis 7. Tag	4	150 ml Lämmermilch
8. bis 10. Tag	4	200 ml Lämmermilch
11. bis 15. Tag	3	300 ml Lämmermilch
3. Woche	2	600 ml Lämmermilch
4. bis 6. Woche	2	700 ml Lämmermilch
7. Woche	2	500 ml Lämmermilch
8. Woche	1	500 ml Lämmermilch

Dieses Schema dient als Richtlinie. Bei Erhöhung der  
Milchmenge für einen schrittweisen Übergang sorgen. Ab  
der zweiten Woche gutes Heu, Lämmerpellets und frisches  
Wasser frei zur Verfügung stellen.

Mindestens haltbar bis  
Siehe Verpackung

Chargennummer  
Siehe Verpackung.

Lagerungshinweis  
Kühl und trocken lagern.  
Nach Gebrauch den Eimer gut verschließen.

Zulassungsnummer des Herstellers  
αNL09882  
GMP+ FSA gesichert  
PDV103322

Topro: eingetragene Marke von

**farmula**

Farmula GmbH  
Eper Straße 3  
D-48599 Gronau  
info@farmula.de  
www.farmula.de

**topro**  
animal health

