



animal health
topro



Vermindert het risico op tetanie
Reduces the risk of tetany
Reduziert das Risiko von Tetanie
Réduit le risque de tétanie

21 dagen | 21 days

magnesium

6 06 x ZL



NL

Mineraal dietvoeder voor rundvee in de vorm van een bolus voor orale toediening, ter vermindering van het risico van tetanie (hypomagnesemie of kopziekte).

Afgifteduur

Geleidelijke afgifte gedurende 21 dagen.

Samenstelling

Magnesiumoxide, magnesiumfosfaat, plantaardige vetten van koolzaad, dicalciumfosfaat.

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit	<0,5%
Ruw vet	24%
Ruwe as	70,8%
Ruwe celstof	0,4%
Calcium	0,6%
Natrium	0%
Fosfor	2,6%
Magnesium	27%

Toevoegingsmiddelen per kg

Vitamines

3a700 Vitamine E 3.500 IE

Dosering

- 2 bolussen in één keer ingeven bij het uitweiden in de lente.
- Indien nodig kunnen 1 maand later nog een keer 2 bolussen gegeven worden.
- Niet toedienen aan runderen beneden de 250 kg.

Gebruiksaanwijzing

- Toedienen met een geschikte bolusschiet (folie verwijderen).
- Aanbevolen wordt om voor gebruik het advies van een dierenarts of voederdeskundige in te winnen met betrekking tot het evenwicht van het dagelijks rantsoen en de opname van vezels en gemakkelijk beschikbare energiebronnen.

Bewaren

Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

Tenminste houdbaar tot

Zie verpakking.

Batchnr.

Zie verpakking.

FR

Aliment minéral diététique pour bovins en forme de bolus pour administration orale, a fin de réduire le risque de tétanie (hypomagnésie).

Durée de libération

Libération progressive pendant 21 jours.

Composition

Oxide de magnésium, phosphate de magnésium, matières grasses de colza, dicalcium de phosphate.

Constituants analytiques

Protéines brutes	<0,5%
Matières grasses brutes	24%
Cendres brutes	70,8%
Cellulose brute	0,4%
Calcium	0,6%
Sodium	0%
Phosphore	2,6%
Magnésium	27%

Additifs par kg

Vitamine

3a700 Vitamine E 3.500 UI

Dosage

- Appliquer 2 bolus en une seule fois lors du pâturage au printemps.
- Si nécessaire administrer encore une fois 2 bolus 1 mois plus tard.
- Ne pas administrer au bétail de moins de 250 kg.

Mode d'emploi

- Appliquer avec un lancebolus adapté (retirer le film).
- Avant l'utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire ou d'un expert en nutrition animale en ce qui concerne l'équilibre de la ration journalière et l'inclusion de fibres et les sources d'énergie disponibles facilement.

Conserver

Conserver frais et sec, hors de portée d'enfants. Protéger contre le gel.

Date limité de conservation

Voir emballage.

No de lot

Voir emballage.

EN

Dietetic mineral feed for cattle in the form of a bolus for oral administration, to reduce the risk of tetany (hypomagnesaemia or grass tetany).

Release duration

Gradual release over 21 days.

Composition

Magnesium oxide, magnesium phosphate, vegetable fat from rapeseed, dicalcium phosphate.

Analytical constituents and amounts

Crude protein	<0.5%
Crude fat	24%
Crude ash	70.8%
Crude fibre	0.4%
Calcium	0.6%
Sodium	0%
Phosphorus	2.6%
Magnesium	27%

Additives per kg

Vitamins

3a700 Vitamin E 3,500 IU

Dosage

- Administer 2 boluses at the same time when pasture in spring.
- If necessary, administer 2 more boluses 1 month later.
- Not to be used for cattle lighter than 250 kg.

Instructions for use

- Administer with a suitable bolus applicator (remove foil).
- We recommend consulting a veterinarian or nutritionist in relation to balanced daily feed rations and the absorption of fibres and readily bioavailable energy sources.

Storage instructions

Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost.

Best before

See packaging.

Batch No.

See packaging.

DE

Diätetisches Mineralfuttermittel für Rinder in Form eines Bolus zur oralen Verabreichung, zur Verringerung der Gefahr von Tetanie (Hypomagnesemie).

Veröffentlichungsdauer

Allmähliche Freigabe über 21 Tage.

Zusammensetzung

Magnesiumoxid, Magnesiumphosphat, Pflanzenfett aus Rapsöl, Dicalciumphosphat.

Analytische Bestandteile

Rohprotein	<0,5%
Rohfett	24%
Rohasche	70,8%
Rohfaser	0,4%
Calcium	0,6%
Natrium	0%
Phosphor	2,6%
Magnesium	27%

Zusatzstoffe je kg

Vitamine

3a700 Vitamine E 3.500 IE

Fütterung

- 2 Bolii gleichzeitig verabreichen bei der Beweidung im Frühjahr.
- Falls erforderlich 1 Monat später wieder 2 Bolii verabreichen.
- Nicht verwenden bei Tieren unter 250 kg.

Gebrauchsanweisung

- Verfütterung mit einem geeigneten Bolus-Applikator (folie entfernen).
- Es wird empfohlen vor der ersten Anwendung den Rat eines Futtermittelexperten einzuholen zu der Ausgewogenheit der täglichen Ration und die Aufnahme von Faser und leicht verfügbaren Energiequellen.

Lagerungshinweise

Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen.

Mindestens haltbar bis

Siehe Verpackung.

Batch-Nr.

Siehe Verpackung.



12 x 90 g

Magnesium

21 dagen

21 days

Topro: registered trademark of

Farmula
farming forward

Farmula B.V.
Sluiskolk 3-5
7681 KC Vroomshoop NL
info@topro.nl www.topro.nl

Erkenningsnr. Producent
Registration No. manufacturer
Zulassungs-Nr. Hersteller
No agrément du producteur
αPDV500465

GMP+ FSA geborgd
GMP+ FSA assured
GMP+ FSA gesichert

Garanti GMP+ FSA
GMO controlled
PDV103322



1



2



3