



animal health
topro



Ter stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans
To stabilize water and electrolyte balance
Zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts
Pour stabiliser du bilan des électrolytes et de l'eau

Top Fizz

20 x 60 g



NL

Aanvullend dietvoeder voor kalveren. In de vorm van een brui-tablet voor orale toediening. Stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans ter ondersteuning van de fysiologische spijsvertering.

Samenstelling

Lactose, natriumbicarbonaat, dextrose, natriumchloride, kaliumchloride, magnesium-zouten van stearinezuur.

Analytische bestanddelen

Natrium.....	9,2%
Kalium.....	4%
Chloor.....	8,2%
Ruw eiwit.....	<0,5%
Ruw vet.....	<0,5%
Ruwe as.....	29%
Ruwe celstof.....	<0,5%
Totale suikers.....	61,6%
Citroenzuur.....	14%
Bicarbonaat.....	22%

Toevoegingsmiddelen

Sensoriële

toevoegingsmiddelen

Vanille aroma

Conserveermiddelen

1a330 citroenzuur 140.000 mg/kg

Dosering

Los één tablet in 2 liter warm water (ongeveer 50 °C) per maaltijd. Bij lichte verteringsproblemen de oplossing voeren tussen de melkvoedingen. Bij ernstige verteringsproblemen kan een melkvoeding vervangen worden. Herhaal gedurende 2 of 3 dagen. Dieren met een leumaag moeten niet tegelijkertijd melk gevoed worden.

Gebruiksaanwijzing

Gebruik Topro Top Fizz in geval van risico op spijs-

verteringsstoornissen (diarree), tijdens en na die stoornissen. Aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt.

Bewaaraadvies

Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

Tenminste houdbaar tot

Zie verpakking.

Batchnr.

Zie verpakking.

FR

Aliment complémentaire diététique pour veaux. Sous forme de comprimé effervescent pour administration orale. Stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau afin de faciliter la digestion physiologique.

Composition

Lactose, bicarbonate de sodium, dextrose, chlorure de sodium, chlorure de potassium, sels de magnésium des acides stéariques.

Constituants analytiques

Sodium.....	9,2%
Potassium.....	4%
Chlore.....	8,2%
Protéine brute.....	<0,5%
Matières grasses brutes.....	<0,5%
Cendres brutes.....	29%
Cellulose brute.....	<0,5%
Sucres totaux.....	61,6%

Acide citrique.....	14%
bicarbonate.....	22%

Additifs

Additifs Sensoriels

Arôme de vanille

Conservateurs

1a330 Acide citrique 140.000 mg/kg

Dosage

Dissolvez un comprimé dans 2 litres d'eau chaude (environ 50 °C) par repas. Pour les problèmes digestifs légers, donnez la solution entre les tétées de lait. En cas de problèmes digestifs graves, une tétée peut être remplacée. Répétez pendant 2 ou 3 jours. L'administration simultanée de lait doit être évitée chez les animaux ayant une caillotte.

Mode d'emploi

Utilisez Topro Top Fizz en cas

de risque de troubles digestifs (diarrhée), pendant et après ceux-ci. Avant utilisation et avant prolongation de la durée d'utilisation, il est recommandé de consulter un vétérinaire. Indiquer dans les mentions d'étiquetage. L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsque l'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à ou près de la teneur maximale autorisée.

Conditions de stockage

Conserver frais et sec, hors de portée d'enfants. Protéger contre le gel.

Date limite de conservation

Voir emballage.

No de lot

Voir emballage.

EN

Dietetic complementary feed for calves. In the form of an effervescent tablet for oral administration. Stabilisation of water and electrolyte balance to support the physiological digestion.

Composition

Lactose, sodium bicarbonate, dextrose, sodium chloride, potassium chloride, magnesium salts of stearic acids.

Analytical components

Sodium.....	9,2%
Potassium.....	4%
Chlorine.....	8,2%
Crude protein.....	<0,5%
Crude fat.....	<0,5%
Crude ash.....	29%
Crude fiber.....	<0,5%
Total sugars.....	61,6%
Citric acid.....	14%
Bicarbonate.....	22%

Additives

Sensory additives

Vanilla aroma

Preservatives

1a330 citric acid 140.000 mg/kg

Dosage

Dissolve one tablet in 2 liters of warm water (around 50 °C) per meal. For mild digestive problems, feed the solution between milk feedings. A milk feeding can be replaced in case of serious digestive problems. Repeat during 2 or 3 days. Simultaneous feeding of milk should be avoided in animals with Abomasum.

Instructions for use

Use Topro Top Fizz in case of risk of, during periods of, or recovery from digestive disturbance (diarrhea).

It is recommended that advice from a veterinarian be sought before use and before extending the period of use. The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated where one or more of them is used at or near the maximum permitted content.

Storage Instructions

Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost.

Best before

See packaging.

Batch No.

See packaging.

DE

Diätetisches Ergänzungsfuttermittel für Kälber. In Form einer Brausetablette zur oralen Verabreichung. Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung.

Zusammensetzung

Lactose, Natriumbicarbonat, Dextrose, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumsalze der Stearinsäure.

Analytische Bestandteile

Natrium.....	9,2%
Kalium.....	4%
Chlor.....	8,2%
Rohprotein.....	<0,5%
Rohfett.....	<0,5%
Rohasche.....	29%
Rohfaser.....	<0,5%
Gesamtzucker.....	61,6%
Zitronensäure.....	14%

Bicarbonat.....	22%
-----------------	-----

Zusatzstoffe

Sensorische Zusatzstoffe

Vanille aroma

Konservierungsstoffe

1a330 Zitronensäure 140.000 mg/kg

Fütterung

Pro Mahlzeit eine Tablette in 2 Liter warmes Wasser (ca. 50 °C) auflösen. Bei leichten Verdauungsproblemen füttern Sie die Lösung zwischen den Milchmahlzeiten. Bei schwierigen Verdauungsproblemen kann eine Milchmahlzeit ersetzt werden. Wiederholen für 2 oder 3 Tage. Die gleichzeitige Verfütterung von Milch sollte bei Tieren mit Labmagen vermieden werden.

Gebruiksaanwijzing

Verwenden Sie Topro Top Fizz

im Fall von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall). Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. Die gleichzeitige Anwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn eine oder mehrere davon in der Nähe oder am zulässigen Höchstgehalt verwendet werden.

Lagerungshinweise

Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen.

Mindestens haltbar bis

Siehe Verpackung.

Batch-Nr.

Siehe Verpackung.



20 x 60 g

Top Fizz

Topro: eingetragene Marke von

Farmula
farming forward

Farmula GmbH
Eper Straße 3
D-48599 Gronau
info@farmula.de
www.farmula.de

Erkenningsnr. Producent
Registration No. manufacturer
Zulassungs-Nr. Hersteller
No agrément du producteur
αFR24037002

GMP+ FSA geborgd
GMP+ FSA assured
GMP+ FSA gesichert

Garanti GMP+ FSA
GMO controlled
PDV103322

